

L U M B R E



Urgencias felinas: qué hacer y qué nunca hacer

Materia: Cuidado de mascotas

03/10/2026

Antes de empezar

Las urgencias del gato no se parecen a las del perro: el bloqueo urinario, la intoxicación por paracetamol y la disnea tienen su propio reloj. Los primeros minutos, bien usados.

QUÉ APRENDERÁS

- Actuar ante las urgencias más comunes del gato sin empeorarlas.

El reloj felino: urgencias que se deciden en horas

El objeto de urgencias del curso de perros te dio el semáforo general; aquí, lo específico del gato, que cambia tres cosas: **el bloqueo urinario del macho** (una urgencia que en perro es rara y en gato es estrella), **la intoxicación por paracetamol/lirio** (venenos "de casa" con ventana de tratamiento cortísima) y **la dificultad respiratoria** (un gato con dolor o estrés puede "cerrarse" y descompensarse rápido, y el estrés mal manejado en la clínica también mata).

Además, un principio que en gato pesa el doble: el rescatista doméstico NO cura: protege, no empeora, y corre. Y "correr" incluye cómo lo transportas: un gato en pánico dentro de un transportín mal cubierto llega peor de lo que salió.

Qué vas a aprender


Las cuatro urgencias felinas mayores con su protocolo de primeros minutos, cómo preparar el "kit de pánico" casero, y los errores de transporte/manejo que transforman una visita en emergencia.

Semáforo felino: al rojo se corre, al amarillo se llama

Regla doble felina: un gato "aplanado y silencioso" con dolor puede ser más grave que uno que maulla: el que se esconde y no protesta es el que llega en shock.

Nivel	Se ve así	Qué haces
ROJO (minutos- horas)	Macho que forcejea y NO orina; boca abierta/jadeo (el gato no jadea "normal"); mucosas azuladas o blancas; convulsión; atropellado/caído de ventana; intoxicación conocida (paracetamol, lirio, raticida, antigelo); no orina con panza tensa y dolor	Clínica YA, avisando por teléfono. Moverlo poco y en transportín cubierto; si no respira bien, en caja con rejilla grande sin forcejearlo

Nivel	Se ve así	Qué haces
AMARILLO (hoy)	Vómito repetido con decaimiento; herida por pelea (mordedura de gato se infecta casi siempre); no come 48 h; diarrea con sangre; ojo hinchado/cerrado	Llamas y acuerdas consulta el mismo día
VERDE (vigilar)	Un vómito de bola de pelo aislado y sigue comiendo/jugando; rasguño superficial limpio y activo	Vigilas 12-24 h; si escala a amarillo/rojo, consultas



El rojo felino tiene dos firmas nuevas respecto al perro: no-orinar en macho y boca abierta. Ambas se atienden en horas, no en días.

Las cuatro urgencias estrella del gato

- **Obstrucción urinaria (sobre todo machos):** va al arenero una y otra vez, no sale nada o solo gotas, maulla, lame la genital, panza tensa. El conducto se tapa con moco/cristales y la vejiga se sobredistiende: en 24-48 h puede haber rotura o paro cardíaco por potasio. **Tu única tarea: transporte urgente, sin esperar "a que orine".**
- **Intoxicación por paracetamol (y lirio):** con paracetamol, el signo tardío es edema de cara y patas y mucosas chocolate: si sabes que lo lamió, **VE YA**, aunque

esté bien (antídoto hay ventana corta). Con lirio: mismo principio (objeto de tóxicos).

- **Dificultad respiratoria:** el gato que respira con boca abierta, cuello estirado y abdomen que "bombee" puede estar en edema de pulmón, derrame o asma grave. **No lo estreses ni lo "sientes": caja o transportín con rejilla, mantén el calor y ruta directa a clínica con oxígeno.**
- **Caída desde altura y golpes:** gato "de siete vidas" no existe: vértebras, diafragma, vejiga y pulmón sufren en silencio. Aunque camine bien: consulta (el neumotórax puede aparecer horas después).

VIDEO

Obstrucción urinaria en gatos: la urgencia que no espera

Un veterinario muestra cómo identificar el bloqueo y por qué cada hora cuenta. Compártelo con todos los que convivan con el gato.



Escanea para verlo en Lumbre

<https://www.youtube.com/watch?v=HwXv9w5r1gU>

Lo que NUNCA harás con un gato en urgencia

- NO des medicinas humanas "para auxiliarlo": los analgésicos humanos lo intoxican (el paracetamol es el peor).
- NO provoques vómito sin orden veterinaria.
- NO lo cargues en brazos apretando: un gato con dolor muerde por reflejo (y muerde feo); usa toalla/transportín.
- NO "esperes a mañana" con un macho sin orinar o una respiración con boca abierta.
- NO dejes el transportín sin cubierta (una tela encima): el gato que ve todo el camino entra en pánico y llega peor.

1. Tu gato macho fue tres veces al arenero en una hora, solo salieron gotas con sangre, y su panza está tensa y no te deja tocarla. Tu plan correcto es:

- ☐ Darle un analgésico humano para el dolor y observarlo hasta mañana
- ☐ Trasladarlo YA a una clínica (avisando por teléfono): es el cuadro típico de obstrucción urinaria, una urgencia de horas
- ☐ Ofrecerle comida húmeda para que "se relaje" y orinar solo
- ☐ Masajearle la vejiga para ayudarlo a vaciar

2. Si un gato cae por la ventana y a los 10 minutos camina, come y maulla, ya no necesita veterinario.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Une cada urgencia felina con el error casero que la empeora:

3.	Obstrucción urinaria	-----
3.	Intoxicación por paracetamol	-----
3.	Gato con disnea	-----
3.	Herida por mordedura de otro gato	-----

Opciones: Masajear la vejiga o "esperar a que orine" · Dar más paracetamol "porque tiene dolor" · Forcejearlo y cargarlo sin caja: el estrés dispara el consumo de oxígeno · Dejarla "al aire": se cierra por fuera, abscesos por dentro

4. Clasifica cada paso del "kit de pánico" como "preparar ANTES" o "dejar para el momento" (spoiler: casi todo es antes):

Elementos:

- Transportín con tela de cubierta, siempre armado y "abierto como cama" en casa
- Buscar el número de urgencias a las 2 a.m. con el gato maullando
- Tarjeta junto a la puerta: peso del gato, medicación, veterinario y clínica de guardia
- Toalla grande y guantes para manejar al gato dolorido sin mordidas
- Estudiar la ruta nocturna a la clínica con oxígeno más cercana

Se prepara antes	. . .
Se improvisa	. . .

5. Prepara esta semana tu "kit de pánico felino": 1) transportín afuera con tela encima y premios adentro (que siga siendo un mueble, no el monstruo); 2) tarjeta con peso, medicación, teléfono de tu vet y de la clínica de guardia 24 h más cercana con oxígeno, pegada en el refri; 3) lee la lista de tóxicos (objeto anterior) y ubica el envase/prospecto de lo que tienes por casa: en la urgencia, mostrar el empaque vale oro.

Si en tu casa hay más de un gato, etiqueta una toalla y un transportín por gato: en una urgencia, meter al "otro" por error es una tragedia doble.

En una urgencia felina, el dueño valiente no es el que cura en la sala: es el que no empeora, mete al gato en la caja cubierta y conduce rápido y en calma.

— Huellarte · Mónica Valerio

1. Macho que forcejea y no orina: corre, es de horas.
2. Boca abierta = oxígeno y caja, no brazos: el estrés lo consume más.
3. Paracetamol ingerido: aunque esté bien, clínica ya (antídoto con ventana).
4. Caída de altura "sin nada": revisión igual; las lesiones del pecho esperan.
5. Transportín entrenado + cubierta + tarjeta de urgencias: tu ventaja de minutos.

Siguiente paso: cerramos con la ruta 4, *Convivencia y buen manejo*, empezando por el gran tema nacional: *El arte del arenero: regla $n+1$ y más trucos*.

Referencia curricular

Materia:	Cuidado de mascotas
-----------------	---------------------

Versión interactiva completa (con actividades, videos y autoevaluación):



<https://lumbre.lat/object/masc-gat-r03-oa03>

Material educativo generado desde Lumbre · lumbre.lat